


วาชารี® 10 เอฟแอล



ปกป้องโครงสร้างที่สำคัญและเฟอร์นิเจอร์ของคุณ
จากการทำลายของปลวก ด้วย **Wazary 10FL**

รายละเอียดของสินค้า

ปลวก

พบได้ทั่วไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่น และพบมากในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตที่มีอุณหภูมิสูง ได้มีการประมาณการถึงความเสียหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการทำลายของปลวกทั่วโลกถึงประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทุก ๆ ปี

ปลวกสามารถจำแนกได้ 2 จำพวก คือ **Dry-wood termite** ปลวกไม้แห้ง ซึ่งจะทำรังอยู่ภายในเนื้อไม้ และ **Subterranean termite** ซึ่งจะทำรังในดิน หรือตามซากไม้ที่เน่าเปื่อยผุพังแล้วซึ่งปลวกชนิดนี้เอง ที่เป็นต้นเหตุสำคัญในการทำลายไม้ซึ่งเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างของตัวอาคาร

Sumitomo Chemical ได้มีการพัฒนาสารกำจัดปลวก **Wazary 10 FL** ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมปลวก โดยการจัดการกับโครงสร้างพิเศษหรือกำจัดพื้นที่ที่ปลวกอาศัยอยู่ **Wazary 10 FL** จะตัดวงจรการแพร่กระจายในวงจรชีวิตของปลวก ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าปลวกจะสูญพันธุ์อย่างแน่นอน

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี 2 วิธี คือ ถ้าเป็นอาคารหรือโครงสร้างที่มีอยู่แล้วให้วิธีฉีดลงดิน ส่วนกรณีที่ต้องการควบคุมทางผิวดินทั้งหมดให้ใช้ป่นฉีด ฉีดพ่นให้ทั่วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการหยุดการแพร่กระจายของปลวก

คุณสมบัติเด่น 5 ประการของ Wazary 10 FL

1. มีสารกลุ่ม **Pyrethroid** เป็นสารออกฤทธิ์ **Fenvalerate** ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ใน **Wazary 10 FL** เป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำ และได้มีการจดทะเบียนเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านเคมีเกษตร, เคมีที่ใช้ในสัตว์ และผลิตภัณฑ์สาธารณสุขในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

2. เป็นเคมีภัณฑ์สูตรน้ำ

Wazary 10 FL ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลายเคมี (ที่เป็นเคมีอินทรีย์) ทำให้โอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองน้อยมากและไม่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เหมือนกับตัวยาอย่างอื่นที่ใช้ตัวทำละลายที่เป็นเคมีอินทรีย์

3. มีฤทธิ์กำจัดปลวกและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน

คุณสมบัติข้างต้นเป็นผลมาจากคุณสมบัติอันโดดเด่นของสารออกฤทธิ์ ที่เลือกใช้ในผลิตภัณฑ์

4. สามารถใช้ได้หลายวิธี

Wazary 10 FL นิยมใช้อย่างแพร่หลายทั้งแบบใช้ก่อนและหลังสร้างอาคาร, โครงสร้าง หรือการใช้กับอาคารหรือโครงสร้างเก่า วิธีการใช้จะใช่วิธีฉีดพ่น, ผสมกับดิน, การฉีดอัดเข้าในดินหรือวิธีอื่นๆ อีกหลายวิธี

ประวัติและการพัฒนาสารกำจัดปลวก

ส่วนผสมที่ใช้ในอดีต



สารประกอบอินทรีย์
ไซยาไนด์, ไซยาโนไฮไดรด์, ไซยาโน, สารประกอบอินทรีย์ในคลอรีน
อีเอซี, ดีอีซี, คลอรีน, เฮปทาคลอร์

ส่วนผสมในปัจจุบัน

สารกลุ่มอินทรีย์ในคลอรีน
คลอรีนไฮไดรด์, ไซยาไนด์, ไซยาโนไฮไดรด์, สารกลุ่มไพริสโตรอีน
เพนทาไฮโดร, ไซยาไนด์, ไซยาโนไฮไดรด์, ไซยาโน

ลักษณะเด่นของสาร

สารควบคุมการเจริญเติบโตของปลวก




รูปแบบที่โลก : ดินที่อยู่และการกระจายของ Subterranean termite

ส่วนประกอบของ Wazary 10 FL

ส่วนผสม	%
เพนทาไฮโดร	10
สารช่วยการแพร่กระจาย	4
สารเพิ่มความชื้น	10
น้ำ	76
รวม	100 % (น้ำหนัก / ปริมาตร)

คุณสมบัติทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ

ลักษณะภายนอก	เป็นครีมเหลว สีขาว
ความถ่วงจำเพาะ	1.00 - 1.05 ที่อุณหภูมิ 20°C
ค่าความหนืด	614 cp / 30 รอบต่อนาที
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)	6.8 - 7.3



ปกป้องโครงสร้างที่สำคัญ และเฟอร์นิเจอร์ของคุณ
จากการทำลายของปลวก ด้วย **Wazary 10FL**