

ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี



ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ :
cypermethrin 10% W/V EC.



วอส. 443/2553

ผลิตและจำหน่ายโดย : บริษัท ลิตดา จำกัด
99/220 อ.เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จ.สุราษฎร์ธานี 80900
โทร. 0-2954-3120-6 แฟกซ์. 0-2954-3128
สถานที่ผลิต : 151 หมู่ 8 ต.สามควายเผือก อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3430-5281-2



4. ห้ามฉีดพ่นในท้องที่ที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย 5. ขณะทำการฉีดพ่น ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท

6. ภาชนะบรรจุ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย 7. ห้ามทิ้ง ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี หรือถังภาชนะบรรจุ อุปกรณ์หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีเก็บรักษา 1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ถ้าเป็นเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที 2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี 3. หากเข้าตาให้รับล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 4. หากกลืนกิน ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี

ปริมาณสุทธิ

ลิตร

วันที่ผลิต :

ครั้งที่ผลิต :

ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง เอมลงวัน เอมลงสาบ มด

วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว ลำหับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี อัตรา 10 ซีซี. แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

สำหรับแมลงกลางคืน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี อัตรา 12.5 ซีซี. แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ในท้องครัวและโรงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร ลัทธิเลี้ยง และปลาวัว

คำเตือน 1. ห้ามรับประทาน 2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า 3. หลีกเลี่ยง ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี แล้วเสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด